

Correction à : “Théorème de Torelli pour les cubiques de \mathbb{P}^5 ”

Claire Voisin, CNRS et IHÉS

Soit $L \cong H^4(X_{gen}, \mathbb{Z})$ où X_{gen} est une hypersurface cubique lisse de \mathbb{P}^5 . L est muni de sa forme d’intersection et de la classe h^2 , $h = c_1(\mathcal{O}_{X_{gen}}(1))$, qui est marquée. Soit $\Gamma := \text{Aut}(L, \langle, \rangle, h^2)$ et soit \mathcal{D} le domaine des périodes correspondant. Rappelons le résultat de [6]:

Théorème 1 *L’application des périodes $\mathcal{P} : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{D}/\Gamma$, définie sur l’espace de modules \mathcal{M} des hypersurfaces cubiques de \mathbb{P}^5 lisses ou admettant au plus un point double ordinaire, est un plongement ouvert.*

Ce théorème a été redémontré récemment par Looijenga [3].

La stratégie de la démonstration de [6] consiste à étudier l’hypersurface $\mathcal{H} \subset \mathcal{M}$ paramétrant les hypersurfaces contenant un plan. Les deux premières étapes de la démonstration fournissent les énoncés suivants:

Théorème 2 *i) La restriction de \mathcal{P} à \mathcal{H} est injective en codimension 1.
ii) On a $\mathcal{P}^{-1}(\mathcal{P}(\mathcal{H})) = \mathcal{H}$.*

On concluait alors en utilisant l’amplitude de \mathcal{H} et le fait montré dans [1] que l’application des périodes locales est non ramifiée (résultat étendu dans [6] à l’application des périodes globales).

K. O’Grady a observé que l’argument final de [6] est insuffisant, du fait de la non-propreté de l’application des périodes. On remplace ici cet argument par un argument de même nature, mais qui utilise une estimation sur la codimension du lieu d’indétermination de l’application des périodes. Celle-ci est basée sur le résultat suivant dû à Laza [2]. Notons $\overline{\mathcal{M}} = \mathbb{P}(H^0(\mathbb{P}^5, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^5}(3)))/PGL(6)$ la compactification de \mathcal{M} fournie par la théorie des invariants géométriques de Mumford [5].

Théorème 3 (Laza) *i) Les hypersurfaces cubiques à singularités isolées, stables pour l’action de $PGL(6)$, sont à singularités isolées simples.*

ii) Soit $\mathcal{M}' \subset \overline{\mathcal{M}}$ le quotient de cet ensemble par $PGL(6)$. Alors le complément $Z := \overline{\mathcal{M}} \setminus \mathcal{M}'$ est de dimension ≤ 8 .

Remarque 4 L’estimation sur la dimension de Z est grossière mais suffisante pour notre application. Elle ne nécessite pas la description complète des orbites minimales donnée dans [2]. Il suffit de savoir que les orbites minimales non stables correspondent à des cubiques admettant des singularités non isolées et d’étudier la stabilité des cubiques singulières le long d’une droite.

On utilisera de façon cruciale le fait que \mathcal{P} s’étend à \mathcal{M}' (tout en restant à valeurs dans \mathcal{D}/Γ) et que de plus, elle est un isomorphisme local au niveau des

déformations miniverselles. En d'autres termes, soit X_t une hypersurface cubique à singularités simples, et $\mathcal{M}_{t,loc}$ la base de la déformation universelle de X_t , (de sorte qu'un voisinage de t dans \mathcal{M}' est obtenu comme un quotient de $\mathcal{M}_{t,loc}$ par le groupe fini des automorphismes de X_t); soit Γ_t le groupe de monodromie local agissant sur $H^4(X_0, \mathbb{Z})$, où X_0 est une fibre lisse proche de X_t ; alors l'application des périodes locales $\mathcal{P}_{loc} : \mathcal{M}_{t,loc} \setminus \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{D}/\Gamma_t$, où \mathcal{S} est le discriminant, s'étend en un morphisme sur $\mathcal{M}_{t,loc}$ (cf [4], chap. 9). Notant que $\mathcal{M}_{t,loc}$ et \mathcal{D}/Γ_t sont lisses (pour le second, voir [4], p. 182), le fait que \mathcal{P} soit non ramifiée sur \mathcal{M} (et donc sur \mathcal{M}') entraîne que \mathcal{P}_{loc} est un isomorphisme local.

Ceci entraîne que l'application \mathcal{P} étendue à \mathcal{M}' est ouverte, localement finie et est un isomorphisme local au point t si et seulement si elle est de degré local 1 au point t . Montrons maintenant:

Proposition 5 *Notant \mathcal{H}' la clôture de \mathcal{H} dans \mathcal{M}' , les énoncés i) et ii) du théorème 2 restent vrais par \mathcal{H}' . De plus \mathcal{P} est un isomorphisme local le long de \mathcal{H}' .*

Démonstration. En effet, ii) est satisfait dans \mathcal{M} et donc en codimension 1 sur \mathcal{M}' . Or \mathcal{P} est localement finie sur \mathcal{M}' et donc $\mathcal{P}^{-1}(\mathcal{P}(\mathcal{H}'))$ est de codimension pure 1. Pour i), l'allure locale de \mathcal{P} montre que si $x \neq y \in \mathcal{H}'$ satisfont $\mathcal{P}(x) = \mathcal{P}(y)$, de telles paires existent en codimension 1 dans \mathcal{H}' , et donc dans \mathcal{H} , ce qui contredit le fait que i) est vrai en codimension 1 sur $\mathcal{H} \subset \mathcal{H}'$ comme montré dans [6] (cet argument est dû à K. O'Grady). Le dernier énoncé résulte alors du fait que \mathcal{P} est non ramifiée (cf [6]), de sorte que par ii), le degré local de \mathcal{P} le long de \mathcal{H}' est égal au degré local de $\mathcal{P}|_{\mathcal{H}'}$, c'est-à-dire 1 d'après i). ■

Conclusion de la preuve du théorème 1. On veut montrer l'injectivité de \mathcal{P} sur \mathcal{M} . Supposons qu'on ait $x \neq y \in \mathcal{M}$ avec $\mathcal{P}(x) = \mathcal{P}(y)$. Comme \mathcal{P} est ouverte sur \mathcal{M}' , on peut supposer que $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{D}/\Gamma$ paramètre une structure de Hodge polarisée (avec la classe h^2 marquée) sans automorphisme non trivial. Par ce qui précède, ceci garantit que l'application \mathcal{P} est un isomorphisme local au voisinage de x et de y . Soit $K \subset \overline{\mathcal{M}}$ l'intersection complète de 9 hypersurfaces suffisamment amples et suffisamment génériques contenant x et y . Comme $\dim Z \leq 8$, K ne rencontre pas Z et donc \mathcal{P} est bien définie le long de K . De plus K est projective (de dimension 11).

Comme K est une intersection complète de 9 hypersurfaces suffisamment générales, il en va de même de $\mathcal{P}(K)$ au voisinage de $\mathcal{P}(x) = \mathcal{P}(y)$. Notant K_x et K_y des voisinages de x et y dans K , les surfaces $S_x \subset K$ et $S_y \subset K$ définies respectivement comme $K_x \cap \mathcal{P}^{-1}(\mathcal{P}(K_y))$ au voisinage de x , et $K_y \cap \mathcal{P}^{-1}(\mathcal{P}(K_x))$ au voisinage de y s'envoient par \mathcal{P} sur la même surface $\mathcal{P}(K_x) \cap \mathcal{P}(K_y)$. Soit $\Sigma \subset K$ la clôture de Zariski de $S_x \cup S_y$ dans K . Ce qui précède montre que Σ est une surface projective et que $\mathcal{P}|_{\Sigma}$ est de degré au moins deux au-dessus de son image, (qui est irréductible).

Notons maintenant que l'hypersurface $\overline{\mathcal{H}}$ est ample dans $\overline{\mathcal{M}}$. Il en résulte que $\Sigma \cap \overline{\mathcal{H}} \neq \emptyset$, et comme $\Sigma \subset K \subset \mathcal{M}'$, on a en fait $\Sigma \cap \mathcal{H}' \neq \emptyset$. Mais comme \mathcal{P} est un isomorphisme local au voisinage de \mathcal{H}' et \mathcal{P} est injective sur \mathcal{H}' , la restriction $\mathcal{P}|_{\Sigma}$ de \mathcal{P} à Σ est un plongement sur un voisinage de $\Sigma \cap \mathcal{H}'$. Par ailleurs, on a aussi

$$\mathcal{P}_{|\Sigma}^{-1}(\mathcal{P}_{|\Sigma}(\Sigma \cap \mathcal{H}')) = \Sigma \cap \mathcal{H}'$$

par la proposition 5. Il en résulte que pour un voisinage V de $\mathcal{P}_{|\Sigma}(\Sigma \cap \mathcal{H}')$, $\mathcal{P}_{|\Sigma}$ est un isomorphisme de $\mathcal{P}_{|\Sigma}^{-1}(V)$ sur V , ce qui contredit le fait que $\mathcal{P}_{|\Sigma}$ est de degré ≥ 2 sur son image.

■

Remerciements. Je remercie Kieran O’Grady pour m’avoir signalé cette erreur et pour de nombreux échanges à ce sujet.

References

- [1] A. Beauville, R. Donagi. La variété des droites d’une hypersurface cubique de dimension 4, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 301 (1985), no. 14, 703–706.
- [2] R. Laza. The moduli space of cubic fourfolds, Arxiv: 0704.3256.
- [3] E. Looijenga. The period map for cubic fourfolds, arXiv:0705.0951
- [4] E. Looijenga. *Isolated Singular Points on Complete Intersections*, London Mathematical Society Lecture Note Series 77, Cambridge University press 1984.
- [5] D. Mumford, J. Fogarty, F. Kirwan. *Geometric invariant theory*, third edition, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2), 34, Springer-Verlag, Berlin, 1994.
- [6] C. Voisin. Théorème de Torelli pour les cubiques de \mathbb{P}^5 , Invent. Math. 86, 577-601(1986).